

III. évfolyam 2001/4

Ára: 360.-Ft

# TERRÁRIUM

Terrarisztikai és herpetológiai



„Gekkólábú” kaméleonok

Teknősök a kerti tóban

Falánk szirmok

# Buddha ernyője

20014

9 771585 554004


A legenda szerint Buddha lepihent a forró sivatagba. Feléje küszött egy kígyó, testének első harmadát fel-emelte, majd nyakát szétterpesztve árnyékot adott a vándornak. Buddha hálából „megjelölte” a kígyót és ujjenyomatát az állat nyakára nyomta, innen eredezteti a legenda a monoklis kobraira jellemző kerek, kissé patkó alakú foltot.

A mérgekígyók legnépesebb családja az Elapidae család, több mint 200 fajuk ismert. Az Elapidae családba tartozó monoklis kobra (*Naja kauthia* LESSON, 1831) korábban a *Naja naja* alfajaként tartották számon, ma már önálló fajnak tekintik. Az impozáns kígyó 100-150 cm, ritkán 200 cm-re is megnőhet. Feje inkább a siklókéra hasonlít. A szeme nagy, a pupillája kerek. A fej a nyaktól alig különül el. A test karcsú, izmos testével gyors helyváltoztatásra képes. A monoklis kobra élőhelytől függően különböző színű lehet. Gyakran olajzöld, szürkészöld, barna, vörösesbarna,

jés, bozótos, kissé nyitott teret, de mindig vízközelben marad. Búvóhelye a föld alatti lyukak, természetvárok, többretegű avar kupacok, kövek, fatuskók alatti részek. Rejtekhelyét általában napnyugta után hagyja el. Vadásútjain elsősorban békákat, gyíkokat, kisebb emlősöket zsákmányol. Ritkán madarakat is elragad.

## Tartás

A monoklis kobra tartása, tenyésztése gyakorlott kígyó-tartóknak nem okoz semmilyen gondot. Kedveli az állandó magas hőmérsékletet: 27-32 °C-on táplálkozik a legjobban. Egy pár állat számára megfelel egy 150×60 cm alapterületű, és 80-100 magas terrárium. Nálam a kígyók napi 10-12 órás megvilágítást



tot előzőleg leölni, és így kínálni. Táplálékul megfelel a kígyók nagyságától függően az egér, később a patkány.

## Tenyésztés

A párzás ciklus novembertől decemberrig tart. Az aktív párzás szinte spontán történik meg, stimulációra nincs szükség. A hím hevesen űzi a nőtényt, a kopulációra többször is sor kerül. A nőtény a tojásokat január és április közötti időben rakja le. Közvetlenül a tojásrakás előtt a nőtény idegessé válik, szinte végigpásztázza a terrárium minden egyes zugát, hogy a tojások számára alkalmas helyet keressen. Jól bevált, ha egy nagyobb dobozt nyirkos tőzegegel töltöttem fel, így biztosítva a „kobrafészket”. A tojásokat 28-32 °C fok közötti hőmérsékletre beállított kelte-tőbe kell elhelyezni. A keltező páratartalma 80-90 %-os. Ilyen körülmények között a tojásokból a kis kígyók 50-90 nap alatt kelnek ki. A frissen kikelt kicsinyek kb. 30 cm hosszúak, és intenzív táplálás mellett nagyon gyorsan nőnek. Az első vedlés a kelés után 4-6 nappal várható, ezt követően már megkínálhatjuk a kis kobrákat napos egérrel. Ritkán, de előfordul, hogy egyik-másik apróságot egy rövid ideig tömni kell. A monoklis kobrák 3-4 éves korukra válnak ivaréretté, és fogságban akár 20 évig is élhetnek.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy a kobrák veszélyes állatok, mérgeikkel képesek az embert megölni, ezért ezeket az állatokat csak kellően felnevelt, tapasztalt kígyótartó szerezzék be – természetesen a szükséges engedélyek birtokában!

A címlapon Buzás Balázs felvétele

# Buddha ernyője

Írta: Dernei Zsolt

fekete színű, de találtak már albínó példányt is! A tarkó közepén található jellegzetes folt fekete-fehér szegélyű, a világos egyedeknél a monokli kevésbé látható. A monoklis kobra Ázsia nagy részén honos: Vietnám, Thaiföld, Nepál, Banglades, Burma, Buthán és Észak-kelet Indiában él. Elterjedési területén gyakran a falvak, városok környékén is fellelhető. Itt valószínűleg az ember környezetében élő patkányok után jár zsákmányolni. Kedveli a cser-

lajfűtésre nincs szükség. Berendezésnek néhány fatuskót, faágat és követ használok, ezek biztosítják a megfelelő búvóhelyet. Élő növényt nem célszerű beültetni, mert a nagytestű, robusztus állatok a legerősebb növényt is letaposák. Ezért, hogy növeljem komfortérzetüket, műnövényt használok. Elegendhetetlen egy nagyobb méretű itatótál. Talajként erdei földet, kéregzúzalékot, vagy macskaalmot kókuszrosttal összekeverve használok. A monoklis

kobrák kedvelik a párás környezetet, ezért naponta permetezem a terráriumot.

## Étetés

A nálam párban tartott kobrák rendkívül agresszíven táplálkoznak. Az élő zsákmányállatra hihetetlen gyorsasággal támadnak, ilyenkor nem ritka az összeevés, összemarás sem. Sajnos nem egyszerű az ilyen összeakaszkodott állatokat a testi épségünket nem veszélyeztetve szétszedni. Ezért célszerű a takarmányállá-



A szerző felvétele